

IOTN

PAR Auswertungsformular



		Behandlungsbeginn					Behandlungsende					Bewertung					
		ungewichtet			gewichtet		ungewichtet			gewichtet		Kontaktpunktabweichungen (Eckzahn bis Eckzahn)					
Frontzähne		3-2	2-1	1-1	1-2	2-3	x 1	3-2	2-1	1-1	1-2	2-3	x 1	0 0 - 1 mm 1 > 1 - 2 mm 2 > 2 - 4 mm 3 > 4 - 8 mm 4 > 8 mm 5 retinierter Zahn (Lücke <= 4 mm)	Beurteilung im Wechselgebiss mittels der durchschnittlichen mesio-distalen Breitensumme: OK 22 mm (Impaktion <= 18 mm) UK 21 mm (Impaktion <= 17 mm)		
Oberkiefer															Abw. zw. Milchz. u. bleib. Z. werden nicht gemessen		
Unterkiefer															Lücken nur wenn KFO-Lückenschluß erfolgt bzw. bei Lückenöffnung wenn Lücke < 4 mm		
bukkale Okklusion		rechts			links		x 1	rechts			links		x 1	sagittal (Eckzahn bis letzter Molar)	transversal (Prämolaren u. Molaren)	vertikal (Eckzahn bis letzter Molar)	
sagittal														0 gute Verzahnung Kl. I, II od. III 1 < 1/2 PM-Breite Abweichung 2 = 1/2 PM-Breite Abweichung (Höcker-Höcker Verzahnung)	0 kein KB 1 KB Tendenz (Kopfbiss) 2 1 Zahn im KB 3 > 1 Zahn im KB 4 > 1 Zahn im Scherenbiss	0 kein offener Biss 1 lateral offener Biss (mindestens an 2 Zähnen mehr als 2 mm)	
transversal														Zähne im Durchbruch / Milchzähne in Infraokklusion werden nicht bewertet			
vertikal																	
Overjet (sagittale Schneidezahnstufe)							x 6						x 6	sagittaler Überbiss (Schneidezähne)	0 0 - 3 mm 1 > 3 - 5 mm 2 > 5 - 7 mm 3 > 7 - 9 mm 4 > 9 mm	frontaler Kreuzbiss (inkl. Eckzähne)	0 kein Kreuzbiss 1 mind. 1 Zahn im Kantbiss 2 1 Zahn im KB 3 2 Zähne im KB 4 > 2 Zähne im KB
Überbiss																	
frontaler Kreuzbiss																	
Overbite (vertikale Schneidezahnstufe)							x 2						x 2	Tiefbiss (mittlerer UK Schneidezahn wird gedrittelt)	0 0 - 1/3 1 > 1/3 - 2/3 2 > 2/3 3 ≥ 1/1	offener Biss	0 kein offener Biss 1 ≤ 1 mm 2 > 1 - 2 mm 3 > 2 - 4 mm 4 > 4 mm
Tiefbiss																	
offener Biss																	
Mittellinie							x 4						x 4	0 Übereinstimmung oder bis zu 1/4 einer UK-Schneidezahnbreite 1 1/4 - 1/2 UK-SZ Breite 2 > 1/2 UK-SZ Breite			
Summe		Beginn						Ende									
PAR Veränderung (Beginn - Ende)														Vers. Nr.	Name Patient	Untersucher	
PAR Veränderung in % (Beginn - Ende / Beginn x 100)																	